

Indikácia pacienta pre podanie bamlanivimabu/etesevimabu

Bamlanivimab/etesevimab sú monoklonálne protilátky určené k liečbe COVID-19 pozitívnych dospelých a detí starších ako 12 rokov (s hmotnosťou viac ako 40 kg), u ktorých je vysoké riziko ťažkého priebehu ochorenia. Indikácie a kontraindikácie pre jednotlivé MAB sú vždy uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku a Usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. MAB sú vo fáze posudzovania, alebo schválené regulačnými autoritami v režime núdzovej autorizácie. Ich použitie je možné aj na základe povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 3 písmeno b) a ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z.

Bamlanivimab/etesevimab je indikovaný u pacientov:

- **s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP alebo prostredníctvom rýchlej PCR diagnostiky**
- **s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia**
- **a ktorí nevyžadujú hospitalizáciu, alebo aj pacientom, ktorí musia byť z nejakého iného špecifického dôvodu ako ochorenie COVID-19 hospitalizovaní**
- **a ktorí nevyžadujú liečbu kyslíkom (monoklonálne protilátky B/E nie sú podané u pacientov, ktorí vyžadujú mechanickú pľúcnu ventiláciu, ECMO alebo podávanie O₂ s vysokým prietokom)**
- **do 10 dní od nástupu symptómov**

Podanie bamlanivimabu/etesevimabu môže odporučiť lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, lekár v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo. V prípade, ak je pacientovi indikovaná liečba monoklonálnymi protilátkami nie je možné aby bol pacientovi indikovaný zároveň aj liek Lagevrio 200mg s účinnou látkou molnupiravir.

V prípade, že indikujete pacienta pre podanie bamlanivimabu/etesevimabu, prosím, potvrdte dôvod indikácie:

Meno:

Príezvisko:

Bydlisko:

Dátum narodenia:

ZP:

Dátum začiatku príznakov:

Dátum RT-PCR testu:

Pacient s ochorením COVID-19, ktorý má vysoké riziko ťažkého priebehu ochorenia (vyznačte pravdivé)

- Pacient starší ako 65 rokov
- Pacient s obezitou a BMI viac ako 35
- Pacient s renálnym zlyhaním (CKD G3 - G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom
- Pacient s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie
- Pacient s chronickým srdcovocievny ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti.
- Pacient s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií.
- Pacient s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti
- Pacient s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami
- Pacient s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19
- Imunokompromitovaný pacient so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Tito pacienti sú tiež kandidátmi na podanie v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.

Podpis a pečiatka indikujúceho lekára:

Podpis pacienta:

V....., dňa